

Brote de Fiebre Amarilla

SÍNTOMAS DE ALERTA

¡ATENCIÓN A ESTAS SEÑALES!

LA ENFERMEDAD TIENE FASES:

Inicial: Fiebre alta, dolor de cabeza, escalofríos y dolores musculares (parecido al dengue).

Remisión: Breve mejoría de 24 horas.

Grave (Toxémica): Vuelve la fiebre, aparece la ictericia (piel/ojos amarillos), orina oscura y posibles hemorragias.

Letalidad: Hasta el 50% de los casos graves pueden ser fatales.




¿CÓMO SE TRANSMITE? NO ES DE PERSONA A PERSONA

Se transmite por la picadura de
mosquitos (*Aedes aegypti* en ciudades y
Haemagogus/Sabethes en zonas selváticas).



La Situación **ACTUAL** ¿QUÉ ESTÁ PASANDO?



La **OPS** ha clasificado el **riesgo** en **Sudamérica** como **"Alto"** debido al aumento de casos y mortalidad.

En **Venezuela** se ha detectado un **brote reciente** con **36 casos confirmados** y presencia del virus en **14 estados**.

Se han identificado **síntomas en humanos** y **muerres en monos (epizootias)** en diversas regiones.



¿Dónde está el riesgo?

(estados prioritarios)



Zonas de mayor vigilancia



El Gobierno ha iniciado una **jornada especial** en **22 parroquias** de estos **4 estados clave**:

- 📍 Aragua
- 📍 Lara
- 📍 Barinas
- 📍 Portuguesa

Nota: Si vives en estas zonas o vas a viajar a ellas, la vacunación es urgente.

